

## Poznejše setve korenja

Najbolj poznana nam je setev korenja spomladi, brez večjih težav pa ga lahko sadimo v razmakih in imamo mladi korenček vedno pri roki. Če ga sezemo avgusta se bomo s tem izognili napadu najhujšega škodljivca za korenje, ki se imenuje korenjeva muha. Sezemo ga zaradi korena vendar so užitni tudi njegovi listi, ki se lahko uporabijo za kremno špinačo. Za setev potrebujemo rahla tla, globoka, struktorna in s hraničnimi snovmi bogata tla. Če vrt ne ustrezajo opisanim zahtevam, to popravimo tako, da zemlji premešamo obilo dobro zrelega komposta. Najboljši zelenjavni sosedji so zanj grah, česen, por, solata... Če sadimo pozno si izberemo zgodne sorte, ker korenček kali tudi 20 dni in več, pri poznejših pa tvegamo, da bomo imeli manjše korenčke, ker bo lahko hladna jesen. Sadi se ga v vrstah, ker lažje odstranjujemo plevel in med vrstami naj bo 15 cm razmaka in seme naj bo posajeno 1 do 2 cm globoko. Če je po setvi sušno obdobje, moramo posevec redno zalivati, ker se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da se kaleče seme posuši. Sočen korenček si pridobimo s primernimi razmerami, kar pomeni, da ga redno zalivamo, dogmojujemo in da pravočasno spravimo pridelek, kar je najpomembnejše, če ga spravljamo prepozno, se poveča vlaknasta sredica, kar škoduje sočnosti saj se s tem zmanjša mesnati del korena. Dozorelost dosežejo rastline, ko začno rumeneti zunanji listi in takrat poberemo pridelek. Če ga sadimo pozneje, je korenček primeren za sprotno rabo in ga pustimo v zemlji dokler nam vreme to dopušča. Kornjeva muha pa je ličinka muha, ki odlaga svoje iztrebke v korenje in zaradi tega korenje postane neprivlačno na pogled in je slabše kvalitete ter grenkega okusa. Zaradi napada muhe pa ostane majhno in se ne debeli ter začne gniti. Odrasla muha je črne barve in ima rjavo glavo ter je velika 4- 5 mm, jajčeca pa so umazano bele barve, ličnka je bela in meri 6 do 8 mm in je v zadnjem delu nekoliko širša. Če je rastlina napadena se vidi po listju, ki je na začetku vijolične barve in kasneje porumeni ter se posuši. Muha odloži približno okoli 100 jajčec in sicer najraje na vlažnih tleh, ki pa so tudi zaraščena in so primerno lahka. Bube prezimijo v tleh in za učinkovito preganjanje je pomemben kolobar, ki predvideva korenje na istih tleh vsake štiri leta. Priporočena je zelo zgodnja setev ali pa zelo pozna ter izkop konec avgusta. Zemljo je priporočljivo povaljati in s tem preprečiti razpoke, kjer muha odlaga jajčeca, priporoča pa se tudi, da med korenček posadimo čebulo, ker s svojim vonjem odganja muho. Če so rastline napadene jih je potrebno populiti in uničiti.

Vir: revija Bodi Eko, april 2011