

## 52. ČLANEK

### TEMA : JAJČEVEC

Jajčevcevec je subtropska rastlina z jajčasto oblikovanimi plodovi, ki so navadno vijolični ali beli. Sorta jajčevca je vijoličasti dolgi. Jajčevcevec ima podobne zahteve kot paradižnik in paprika. Najbolje uspeva v toplih, sončnih legah v vlažnih razmerah v rastlinjaku. Seveda pa lahko uspeva tudi na prostem, posebno če je zavarovan s steklom ali folijo. Na prostem gojimo jajčevce v rodovitni zemlji, ki dobro prepušča vodo, na sončnih brezvetrnih legah vrta. Pred sajenjem zemljo pognojimo z gnojilom, ko pa se začnejo plodovi debeliti še dognojimo<sup>9</sup>. Sadike vzgojimo podobno kot pri papriki pri visoki temperaturi. V začetku marca posejemo seme na redko v zabožčke ali druge posode pri temperaturi 20 stopinj celzija. Seme kali počasi in tudi rastoče rastlinice potrebujejo veliko toplote. Postopek pridelave sadik pa je sledeč: v začetku marca seme posejemo na vlažen kompost in ga pokrijemo z kompostom. Zabožčke pokrijemo s stekom in papirjem in gojimo pri temperaturi 21 stopinj celzija. Stekljeni pokrov vsak dan obrnemo. Ko so rastline dovolj velike, da jih lahko primerno, pikiramo vsako posebej v lončke in jih postavimo v prostor s temperaturo od 18 do 21 stopinj celzija. Od aprila do maja vrečo napolnimo z vlažno šoto in vanjo posadimo dve rastlini. Pred presajanjem dobro zalijemo. Ko so rastline visoke od 23 do 30 cm jim odščipnemo rastni vršiček, da pospešimo razraščanje 3 do 4 stranskih poganjkov. Rastline privežemo ob palice. Poleti malo<sup>9</sup>, vendar pogosto zalivamo z vodo in gnojilom. Škropimo tudi proti ušem in pršicam, še posebej pa v vročem vremenu. Na vsaki rastlini pustimo le 5 do 6 plodov, ostale odstranimo, prav tako tudi cvetove. Plodovi so enakomerno razporejeni po rastlini. Od avgusta 15 do 20 cm dolge in temno škrlatne plodove porežemo z ostrim nožem.

V ogrevan rastlinjak presajamo sadike od aprila dalje, v lonček napolnejnim s šoto pa v vsako po dve rastlini. Ob vsakem zalivanju dognojujemo. Najbolje uspevajo pri temperaturi 15 do 18 stopinj celzija. V rastlinjak, ki ni ogrevan sadik ne sadimo do začetka maja.

Od avgusta do septembra režemo plodove jajčevcev z ostrim nožem, ko so dolgi 15 do 20 cm in so res temno vijolične barve.

Na jajčevcih se zelo pogosto naselijo uši. Takoj ko jih opazimo jih poštropimo s posebnimi pripravki.

VIR: knjiga Pridelovanje vrtnin, Tony Biggs, založba Kmečki glas, 1986

